

Segédlet a parlagi sas (*Aquila heliaca*) fiókák korhatározásához a Kárpát-medencében



0 hetes (0-2 napos) Ápr. 26. - Máj. 11.	0-1 hetes (2-5 napos) Ápr. 29. - Máj. 14.	1 hetes (5-9 napos) Máj. 3-18.	1-2 hetes (9-12 napos) Máj. 6-21.	2 hetes (12-16 napos) Máj. 10-25.	2-3 hetes (16-19 napos) Máj. 13-28.	3 hetes (19-23 napos) Máj. 17. - Jún. 1.	3-4 hetes (23-26 napos) Máj. 20. - Jún. 4.	4 hetes (26-30 napos) Máj. 24. - Jún. 8.	4-5 hetes (30-33 napos) Máj. 27. - Jún. 11.
--	--	---	--	--	--	---	---	---	--



5 hetes (33-37 napos) Máj. 31. - Jún. 15.	5-6 hetes (37-40 napos) Jún. 3-18.	6 hetes (40-44 napos) Jún. 7-12.	6-7 hetes (44-47 napos) Jún. 10-25.	7 hetes (47-51 napos) Jún. 14-29.	7-8 hetes (51-54 napos) Jún. 17. - Júl. 2.	8 hetes (54-58 napos) Jún. 21 - Júl. 6.	8-9 hetes (58-61 napos) Jún. 24. - Júl. 9.	9 hetes (61-65 napos) Jún. 28. - Júl. 13.	10-11 hetes (68-77 napos) Júl. 5-27.
--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

Megjegyzések a segédlethez:

Az egyes kategóriákhoz megadott „hetes” és „napos” korok az **átlagos fejlettségű** fiókákra vonatkoznak. Amennyiben egy fiókának tápláltsági vagy egészségügyi problémái vannak, a fióka valós kora akár 1-3 héttel is idősebb lehet az átlagos fejlettség alapján becsülthöz képest.

Az egyes kategóriákhoz megadott **dátum periódusok** az **átlagos költési időszakra** vonatkoznak a Kárpát-medencei populációban. Kivételes esetekben 1-2 hetes (átszíneződő új párok esetében), vagy akár 3-5 hetes (az első fészekalj pusztulása utáni pótköltés esetén) csúszás is előfordulhat az átlagos költési időszakhoz képest.

A **pirossal kiemelt költési stádiumokban** rendkívül érzékenyek a fiókák a zavarásra, így ekkor ne közelítsük meg a fészket, hacsak azt a szülő madarak pusztulása vagy eltűnése nem indokolja!